

[IT CookBook] 기초 신호 및 시스템
: 개념과 원리가 한눈에 보이는 200여 개의 풍부한 예제

[연습문제 답안 이용 안내]

- 본 연습문제 답안의 저작권은 한빛아카데미(주)에 있습니다.
- 이 자료를 무단으로 전제하거나 배포할 경우 저작권법 136조에 의거하여 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있고 이를 병과(併科)할 수도 있습니다.

Chapter 10 이산 시간 푸리에 급수

[Quick Review]

[1] *Ans)* \times

[2] *Ans)* 2π

[3] *Ans)* 주기

[4] *Ans)* \circlearrowleft

[5] *Ans)* 샘플링

[6] *Ans)* 단위원, 등간격

[7] *Ans)* \circlearrowleft

[8] *Ans)* \times

[9] *Ans)* \times

[10] *Ans)* 반주기

[11] *Ans)* 공액 대칭

[12] *Ans)* \times

[13] *Ans)* \times

[기초 문제]

10.1 Ans)


- (a) $X_0 = 1, \quad X_1 = -j\frac{1}{2}, \quad X_2 = 0, \quad X_3 = j\frac{1}{2}$
 (b) $X_0 = 0, \quad X_1 = -j\frac{1}{2}, \quad X_2 = -1, \quad X_3 = j\frac{1}{2}$
 (c) $X_0 = \frac{1}{2}, \quad X_1 = \frac{1}{4} - j\frac{1}{4}, \quad X_2 = 0, \quad X_3 = j\frac{1}{4} + j\frac{1}{4}$

10.2 Ans)


- (a) $X_0 = \frac{1}{8}(1+1+1) = \frac{3}{8}, \quad X_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{16}(1-j1), \quad X_2 = -j\frac{1}{8}, \quad X_3 = \frac{2-\sqrt{2}}{16}(1+j1)$
 $X_4 = \frac{1}{8}, \quad X_5 = \frac{2-\sqrt{2}}{16}(1-j1), \quad X_6 = j\frac{1}{8}, \quad X_7 = \frac{2+\sqrt{2}}{16}(1+j1)$
 (b) $X_1 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad X_3 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad X_0 = X_2 = 0$

10.3 Ans)


- (a) $X_1 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad X_7 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad X_k = 0, \quad k = 0, 2, 3, 4, 5, 6$



- (b) $X_0 = 0, \quad X_1 = \frac{1}{2}, \quad X_2 = 0, \quad X_3 = \frac{1}{2}$




- (c) $X_3 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}, \quad X_4 = \frac{1}{2}, \quad X_8 = \frac{1}{2}, \quad X_9 = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}$
 $X_k = 0, \quad k = 0, 1, \dots, 11, \quad k \neq 3, 4, 8, 9$



10.4 Ans)

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} & X_0 = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{0\pi}{2} \right) = 1 \quad X_2 = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{2} \right) = 0 \\
 & X_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad X_3 = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{3\pi}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{(b)} & X_0 = \frac{1}{3} \left(1 + \cos \frac{0\pi}{3} \right) = \frac{2}{3} \quad X_3 = \frac{1}{3} \left(1 + \cos \frac{3\pi}{3} \right) = 0 \\
 & X_1 = \frac{1}{3} \left(1 + \cos \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} \quad X_4 = \frac{1}{3} \left(1 + \cos \frac{4\pi}{3} \right) = \frac{1}{6} \\
 & X_2 = \frac{1}{3} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{1}{6} \quad X_5 = \frac{1}{3} \left(1 + \cos \frac{5\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}
 \end{array}$$



10.5 Ans)

$$\begin{array}{l}
 \text{(a)} \quad x[n] = 2 + 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) \\
 \text{(b)} \quad x[n] = (1 + (-1)^n)(1 - 2\cos(\frac{\pi}{4}n)) + 2\cos(\frac{\pi}{2}n) = \begin{cases} 8, & n = 4, 12, 20, 28, \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\
 \quad \xrightarrow{\cong} x[n] = [\dots, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, \dots] \\
 \text{(c)} \quad x[n] = (1 + (-1)^n)(1 + 2\cos(\frac{\pi}{4}n)) \\
 \quad \xrightarrow{\cong} x[n] = [\dots, 6, 0, 2, 0, -2, 0, 2, 0, 6, 0, 2, 0, -2, 0, 2, 0, 6, \dots]
 \end{array}$$

[응용 문제]

10.6 Ans) 다음과 같은 이산 주기 신호의 DTFS를 구하여라.

(a) $X_0 = X_1 = \frac{1}{2}$

(b) $X_0 = 0, X_1 = 1$


10.7 Ans)

(a) $X_k = \frac{j}{12} \left(-2 \sin \frac{\pi}{6}k - 4 \sin \frac{\pi}{3}k - 6 \sin \frac{\pi}{2}k \right)$

$$X_0 = 0, \quad X_1 = -\frac{j}{12}(7 + 2\sqrt{3}), \quad X_2 = -\frac{j}{12}(3\sqrt{3}), \quad X_3 = \frac{j}{12}(4),$$


$$X_4 = \frac{j}{12}(\sqrt{3}), \quad X_5 = -\frac{j}{12}(7 - 2\sqrt{3}), \quad X_6 = 0, \quad X_7 = \frac{j}{12}(7 - 2\sqrt{3})$$

$$X_8 = -\frac{j}{12}(\sqrt{3}), \quad X_9 = \frac{j}{12}(-4), \quad X_{10} = \frac{j}{12}(3\sqrt{3}), \quad X_{11} = \frac{j}{12}(7 + 2\sqrt{3})$$



(b) $X_k = \frac{1}{6} \left(1 + 4 \cos(k \frac{\pi}{3}) - 2 \cos(2k \frac{\pi}{3}) \right)$



$$X_0 = \frac{1}{2}, \quad X_1 = \frac{2}{3}, \quad X_2 = 0, \quad X_3 = -\frac{5}{3}, \quad X_4 = 0, \quad X_5 = \frac{2}{3}$$



10.8 Ans)

(a) $x[n] = [\check{9}, 4, 0, 1, 0, 4]$

(b) $x[n] = [\check{9}, 3 + 2\sqrt{2}, 1, 3 - 2\sqrt{2}, 1, 3 - 2\sqrt{2}, 1, 3 + 2\sqrt{2}]$



10.9 Ans)

$$(a) X'_k = (1 - e^{-j \frac{2\pi}{N} k}) X_k$$

$$(b) X'_k = X_{k - \frac{N}{2}}$$

$$(c) X'_k = (1 + (-1)^k) X_k$$

10.10 Ans) $P = X_0 + \sum_{k=1}^{12} 2|X_k|^2 = 21$